

TABULA 156.

ARCTOTIS GRANDIFLORA.

SYNGENESIA POLYG: NECESSARIA.

CHAR: ESSENT: *Recept.* villosum s. paleaceum. *Pappus* Corona pentaphylla.
Cal. imbricatus: squamis apice scariosis.

ARCTOTIS *grandiflora*: flosculis radiantibus fertilibus, foliis pinnatifidis
denticulatis arachnoideis trinerviis, *Ait. Hort. Kew.* vol. 5. p. 272.

Arctotis grandifl. *Lin.* *Syst. veg.* ed. *Gmel.* 1273. *Jacq. Hort. Schönbr.*
vol. 5. p. 67. tab. 378.

Crescit ad Promontorium bonae spei: floret Junio.

CAULIS suffruticosus, parum ramosus, teres, erectiusculus, striatus, villosus,
in pedunculum pedalem terminatus.

FOLIA alterna, petiolata, subpinnata, subtomentosa, subincana, superne re-
curva inferiora semipedalia; pinnis distantibus, uncialibus, sessilibus, ob-
longis, acutis, inaequaliter inciso-serratis.

PEDUNCULI striati, villosi, uniflori, inanes.

FLOS subodoratus diametri fere quadriuncialis.

CALYCIS glabri squamae extimae in appendicem subulatam, reliquae in ovatum
rotundatum concavam hyalinam et fusciscentem desinunt.

COROLLULE radii femineae, fertiles, acutae, utrinque luteae cum basi in-
terna atropurpurea.

PISTILLUM *germen* hirsutum Coronatus calyculo hexaphyllo ex foliolis oblongis
albidis et inferne roseis.

RECEPTACULUM villosum.

Ramulus naturali magnitudine.

1. Semen.