

TABULA 673.

CEREUS TRIANGULARIS,
Æ. FOLIOSUS.

ICOSANDRIA MONOGYNIA.

* * *Cerei repentes, radiculis lateralibus.*

CHAR: ESSENT: *Calyx* monophyllus, superus, imbricatus. *Corolla* multiplex. *Bacca* monocularis, polysperma.

CEREUS *triangularis* Æ. *foliosus*: repens, triangularis. LINNÆ *Spec. Plantar. ed. Cur. WILLD. Tom. II. p. 942.* v. *Jacq. Amer. 152. t. 260. f. 58.*

CEREUS *triangularis scandens, articulatus.* *Hort. Cliff. 182. Hort. Upsal. 121.*

CEREUS *americanus triangularis radicosus.* *BRAD. Succ. I. p. 4. t. 5.*

Habitat in sylvis Martinica, Brasilia, Jamaica montosis; et foliosus in insula Sancti Eustachii. ?.

ARBORES haec planta ad magnam altitudinem scandit, radicibus emissis se affigens; nec absque fulcro sustinere se potest.

RUPES etiam umbrosis investit.

FRUCTUS inter omnes congeneres sapore praestantissimus, cum dulcore acidulus, gratus, refrigerans, figura praecedentis, sed, foliorum loco, solis cicatricibus inaequalis, Martinicensibus, apud quos in pretio est, vocatur *Poirier de Chardon, sive Pyrus cardui.*

CEREUS Æ. *foliosus*: fructu folioso, fatuo. v. *Jacq. Amer. t. 260. fig. 58.*

Varietatem constituere praecedentis opinior hanc plantam; ejus est fructus multo major, nitide coccineus, foliis vestitus fere integris, pulpa candida, sub dulci, fatua, eduli, referta seminibus acris nitidisque.

v. *Jacq. l. c.*

Ramulus florens naturali magnitudine.

1. Fructus maturus major.