

TABULA 684.

SALVIA FORMOSA.

DIANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: *Cal.* subcampanulatus, bilabiatus, labio superiore 2-5-dentato subinde integro, inferiore bifido. *Corolla* ringens. *Filamenta* transverse pedicello affixa.

SALVIA *formosa*: foliis subcordatis, corollarum galea barbata, calycibus trilobis, caule frutescente. *L'HERITIER Stirp. I. p. 41. t. 21. LINN. Spec. Plantar. ed. Cur. WILLD. Vol. I. p. 140.*

SALVIA *Leonuroides*: calycis labio superiore integerrimo, stylo bifariam barbato, floribus axillaribus interrupte verticillatis, foliis cordato-ovatis crenatis. *GLOXIN Observ. Bot. p. 15. t. 2. PAUL Enumer. I. p. 236. Cent. Magaz. XI. t. 376. ROEMER et SCHULTZES Syst. vegetabil. Vol. I. p. 251.*

SALVIA *nodosa*: *RUTZ et PARON. Flor. Peruv. Vol. I. p. 25. t. 41. f. a. Habitat in Peru. 5.*

CAULIS brachicatus, ramis glabris.

FOLIA petiolata, bipollicaria, inferiora et deltoidea, obtusiuscula, obsolete nervoso venosa, subtus rugosula, sub-canescensia.

PEDUNCULI axillares quatuor vel quinque utrinque, breves, nodosi; calycis lobi tres acuti, ovati.

COROLLA coccinea; galea hirsuta. *Stylus* bifariam barbatus.

*Ramus florens naturali magnitudine.*