

TABULA 699.

MYRTUS ACRIS.

ICOSANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: *Calyx* 4-5-partitus. *Petala* 4-5. *Stamina* debilia, *receptaculo* angusto inserta. *Ovarium* 2-3-loculare, polyspermum, *ovulis* placentae centrali insertis. *Stigma* simplex. *Pericarpium* baccatum, polyspermum. *Testa* tenuis. *Embryo* arcuatus, teres, cotyledonibus radícula duplo brevioribus.

MYRTUS *acris*: pedunculis axillaribus terminalibus corymbosisque trichotomis, foliis longioribus, foliis ellipticis convexis coriaceis venosis punctatis, caule arboreo. LINNÉ *Spec. Plantar. cur. WILDENOV. Vol. II. p. 973.*
SWARTZ *Prodr. Nr. 79. Flor. Ind. occid. Vol. II. p. 909.*
Habitat in montibus Jamaicae, Antiguae, Barbados. f.

MYRTUS *caryophyllata*: v. JACQ. *Observ. II. p. 1.*

CARYOPHYLLUS *folio et fructu rotundo*: BREVN. *Prodr. Nr. 2.*

CARYOPHYLLUS *aromaticus Indiae occidentalis, foliis et fructu rotundo.*
PLUCK *Alm. 188. t. 155. f. 5.*

CARYOPHYLLUS: foliis oblongo-ovatis oppositis, racemis lateralibus et terminalibus. BROWN *Jam. Nr. 247.*

CARYOPHYLLUS *racemosus*: MILL. *Dict.*

1. Ramus florens. 2. Ramus fructifer. 3. Bacca matura. 4. Eadem dissecta cum seminibus in situ.