

(2)

DIANDRIA MONOGYNIA.

PHILLYREA.

Linn. G. Pl. 10. Juss. 106. Gærtn. t. 92.

Corolla quadrifida. Bacca supera, monosperma.

TABULA 2.

PHILLYREA LATIFOLIA.

PHILLYREA foliis ovato-cordatis serratis.

PH. latifolia. Linn. Sp. Pl. 10. Desfont. Atlant. v. 1. 8.

PH. folio levitèr serrato. Tourn. Inst. 596.

PH. secunda. Clus. Hist. v. 1. 52.

Φιλλυρεα Dioscoridis.

Φύλλα hodiè.

Φύλλα: Zacynthiorum.

Αγλανθινά Baoticorum.

In montosis asperis insularum Graecarum. Frequens in Cretâ. 17.

Frutex ramosissimus, rigidus, sempervirens, glaber. *Rami* oppositi, stricti, teretes, foliosi. *Folia* opposita, patentia, subsessilia, ovata, subcordata, obtusiuscula, variè serrata; suprâ saturatè viridia, nitida; subtùs pallidiora, obsoletè venosa: superiora angustiora, magisque elliptica. *Stipulae* nullae. *Paniculae* axillares, oppositae, densae, foliis triplò breviores. *Pedicelli* quadranguli, glabri. *Bracteae* parvae, ovatae, concavae, integerrimae, glabrae. *Calyx* campanulatus, quadrifidus, subregularis. *Corolla* campanulata, ochroleuca, calyce duplò longior, quadrifida; laciniis patentibus, ovatis, aequalibus. *Stamina* tubo inserta, laciniis alterna. *Filamenta* brevissima. *Antherae* magnae, cordato-ellipticae, luteolae. *Germen* superum, globosum. *Stylus* rectus, staminibus brevior. *Stigma* obtusum, emarginatum. *Bacca* globosa, subdepressa, violacea. *Semen* magnum, globosum, corneum, putamine tenui, fragili, nec osseo.

a. A. Flos magnitudine naturali et auctâ.

d. Bacca transversè secta.

B. Calyx cum pistillo.

e. Semen.

c. Baccae matura.