

Sibthorp, John ; Smith, James Edward [Editor]: Flora Graeca, sive plantarum rariorum historia, quas in provinciis aut insulis Graecis legit, investigavit et depingi curavit John Sibthorp: hic illic etiam insertae sunt pauculae species quas vir idem clarissimus, Graeciam versus navigans, in itinere, praesertim apud Italiam et Siciliam, invenit (Voluminis primi - Fasciculus primus): Vol. I.

London, 1806

Seite 31

DIANDRIA MONOGYNIA.

5

VERONICA.

Linn. G. Pl. 12. Juss. 99. Gærtn. t. 54.

Corolla quadrifida, rotata, laciniâ infimâ angustiore. *Capsula* supera, bilocularis, polysperma.

TABULA 5.

VERONICA GENTIANOIDES.

VERONICA corymbo terminali hirsuto, foliis radicalibus lanceolatis suberenatis nudis.

V. gentianoides. *Trans. of Linn. Soc. v. 1. 194. Vahl. Symb. v. 1. 1. Willden. Sp. Pl. v. 1. 61.*

V. orientalis erecta, gentianellæ foliis. *Tourn. Cor. 7.*

V. erecta, blattariæ facie. *Buxb. Cent. 1. 23. t. 35.*

In summâ parte, nive solutâ, montis Olympi Bithyni. \mathcal{A} .

Radix perennis, tuberosa, fibris longissimè descendentibus, subsimplicibus. *Caulis* ascendens, spithamæus, subindè pedalis, simplex, parùm foliosus, teres, basi glaber, supernè pubescens. *Folia* radicalia plurima, elliptico-lanceolata, acutiuscula, coriacea, margine plùs minùs crenata, aliquantulùm cartilaginea, utrinque glabra, avenia, rariùs subpubescentia, basi angustata, ferè petiolata; caulina minora, obtusiora, et angustiora, opposita, quandoque connato-perfoliata, hirsuta. *Corymbus* terminalis, erectus, solitariùs, simplex, multiflorus, undique hirsutus, demùm spicatus. *Bracteae* lineari-oblongæ, obtusiusculæ, pedicellis breviores. *Calyx* quadripartitus, inæqualis, obtusus. *Corolla* magna, formosa, dilutè violacea, venis saturatioribus picta; laciniâ infimâ reliquis triplò aut quadruplò minori; tubo virente. *Stamina* declinata, corollâ breviora, glabra. *Antheræ* magnæ, cordatæ, demùm oblongæ. *Stylus* sursùm incrassatus, glaber. *Stigma* obtusum. *Capsula* obcordata, subventricosa, hirsuta, utrinque sulcata, bilocularis, bivalvis, valvulis demùm longitudinalitèr diffissis. *Semina* plurima, elliptica, complanata.

a. Corolla antrorsùm visa, cum staminibus in situ naturali.

c. Calyx cum pedunculo et stylo.

b. Eadem horizontalitèr, tubo expanso.

d. Capsula.

TABULA 6.

VERONICA THYMIFOLIA.

VERONICA corymbo terminali, foliis revolutis incanis, caulibus fruticulosus diffusis, capsularum lobis divaricatis.

In cacumine montium Cretæ, olim Leuci nunc Sphaciotici dictorum. Floret inter saxa nive nupèr operta. \mathcal{A} .

VOL. I.

c