

Sibthorp, John ; Smith, James Edward [Editor]: Flora Graeca, sive plantarum rariorum historia, quas in provinciis aut insulis Graecis legit, investigavit et depingi curavit John Sibthorp: hic illic etiam insertae sunt pauculae species quas vir idem clarissimus, Graeciam versus navigans, in itinere, praesertim apud Italiam et Siciliam, invenit (Voluminis primi - Fasciculus primus): Vol. I.

London, 1806

Seite 40

8

DIANDRIA MONOGYNIA.

TABULA 10.

VERONICA TRIPHYLLOS.

VERONICA floribus solitariis, foliis digitato-partitis obtusis, pedunculis calyce longioribus, seminibus complanatis.

V. triphylos. *Linn. Sp. Pl.* 19. *Fl. Brit.* 25.

V. verna, trifido vel quinquefido folio. *Tourn. Inst.* 145.

In campestribus Thraciae Pontum Bosphorum et Euxinum versus. ☉.

*Radix* fibrosa, annua. *Herba* undique pubescenti-incana, exsiccatione nigrescens. *Caulis* ramosissimus, patulus, ramis tortuosis, teretibus, foliosis. *Folia* primordialia vix lobata; reliqua alterna, subsessilia, tripartita, lobis obovato-oblongis, obtusis, quandoque subrenatis, lateralibus saepius bipartitis. *Pedunculi* axillares, solitarii, erecti, teretes, foliis longiores. *Calyx* quadripartitus, laciniis obtusis; duabus inferioribus majoribus, quandoque dentatis. *Corolla* saturate caerulea, laciniis rhomboideis, acutis, subaequalibus. *Stamina* corollae breviora. *Stylus* staminibus brevior. *Stigma* capitatum. *Capsula* orbiculato-cordata, compressa, ciliata. *Semina* utrinque plurima, obovata, compressa, laevia.

a. Calyx floris, cum pistillo.

b. B. Corolla et stamina.

c. Fructus calyce persistenti suffultus.

d. Capsula seorsim.

PINGUICULA.

*Linn. G. Pl.* 13. *Juss.* 98. *Gaertn. t.* 112.

*Corolla* ringens, calcarata. *Calyx* bilabiatus, quinquefidus.

*Capsula* supera, unilocularis.

TABULA 11.

PINGUICULA CRYSTALLINA.

PINGUICULA corollae inaequali, nectario obtuso petalo breviora, laciniis calycinis oblongis, scapo basi glabro.

In rivulis prope vicum Camandriae in insula Cypro. *D. Ferd. Bauer.*

*Radix* fibrosa. *Folia* plurima, radicalia, elliptico-oblonga, obtusa, integerrima, involuto-concava, glaucescentia, unicolora, undique glanduloso-crystallina, glabra. *Scapi* plures, biunciales, erecti, filiformes, nudi, basi glabri, apice subpubescentes. *Flores* terminales, solitarii, nutantes. *Calyx* subpubescens, laciniis inaequalibus, lineari-oblongis, obtusis. *Corolla* bilabiata, inaequalis: labium superius bilobum, lobis divaricatis, albis, basi purpureo reticulatum; inferius quadrilobum, album margine