

TETRANDRIA MONOGYNIA.

31

TABULA 140.

CRUCIANELLA MONSPELIACA.

CRUCIANELLA caule patenti, foliis lineari-lanceolatis subsenis, floribus spicatis quinquefidis; aristis elongatis tortilibus.

C. monspeliaca. *Linn. Sp. Pl.* 158. *Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 1.* 242.

Rubia spicata repens. *Magnol. Monsp.* 225.

Rubeola supina, spicâ longissimâ. *Tourn. Inst.* 130.

In collibus insularum Græcarum non rara. ☉.

*Habitus præcedentis.* Folia plerumque sena, quorum inferiora breviora, obovata, quandoque ferè orbicularia; superiora lineari-lanceolata; summa linearia. Spicæ præcedenti simillimæ, at flores diversi. Corollæ limbus quinquefidus, lobis longissimè aristatis, aristis omnibus inflexo-tortilibus. Stamina quinque. Stylus ultra medium bipartitus, lobis secundis, longitudine inæqualibus.

Pulchra species, corollis cincinnatis, a nemine ante Sibthorp detectis, distincta.

a. Flos, cum involucrio et bractea, magnitudine naturali.

B. Bractea.

C. Involucrum.

D. Flos ab involucrio sejuncto.

E. Germen cum stylo.

RUBIA.

*Linn. Gen. Pl.* 52. *Juss.* 197.

Corolla monopetala, campanulata, supera. Baccæ duæ, monospermæ.

TABULA 141.

RUBIA TINCTORUM.

RUBIA foliis elliptico-lanceolatis annuis subsenis carinâ asperis, caule aculeato.

R. tinctorum. *Linn. Sp. Pl.* 158. *Willd. Sp. Pl. v. 1.* 603. *Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 1.* 242.

R. tinctorum sativa. *Tourn. Inst.* 114.