

TETRANDRIA MONOGYNIA.

33

flavo-virescens; tubo brevissimo; limbo quinquepartito, basi campanulato, laciniis ovato-lanceolatis, margine revolutis, apice inflexis. *Stamina* in fauce corollae, brevina, patentia, antheris brevibus, bilobis, luteis. *Germen* obovatum, obsolete didymum, subpubescens. *Stylus* semibifidus, stigmatibus obtusis.

*A, A.* Flos, duplici sub aspectu, decuplò auctus.

ERNODEA.

*Swartz. Prodr.* 29. *Fl. Ind. Occ.* v. 1. 223. *Schreb. Gen.* 788.

*Willd. Sp. Pl.* v. 1. 611.

*Corolla* monopetala, hypocrateriformis. *Calyx* quadripartitus. *Stylus* simplex. *Bacca* bilocularis. *Semina* solitaria.

TABULA 143.

ERNODEA MONTANA.

ERNODEA caule tereti pubescente, foliis petiolatis obtusis muticis.

*E. montana.* *Prodr. n.* 343. v. 1. 98.

*Asperula calabrica.* *Linn. Suppl.* 120. *L'Herit. Stirp.* v. 1. 65. t. 32. *Willd. Sp. Pl.* v. 1. 577.

*Sherardia foetidissima.* *Cyrrill. Char.* 69. t. 3. f. 7. *L'Herit.*

*Pavetta foetidissima.* *Cyrrill. Neap. fasc.* 1. t. 1.

*Rubeola cretica foetidissima frutescens myrtifolia, flore magno suaverubente.* *Tourn. Cor.* 5.

*Nerium foetidum, antirrhini folio, flore incarnato.* *Cupan. Panphyt. ed.* 1. v. 1. t. 125.

*Leandro di Candia fruticoso maggiore fetido.* *Zanon. Ist.* 114. t. 47; bene.

In montibus Sphacioticis Cretae. h.

*Radix* lignosa, ramosissima, multiceps, perennis. *Caules* numerosi, ramosissimi, diffusi, subspithamæi, lignosi, teretiuseculi, grisei, tortuosi; ramulis obsolete quadrangulis, pubescentibus, rubicundis, foliosis, apice floriferis. *Folia* opposita, patentissima, semuncialia, brevius petiolata, ovato-lanceolata, plus minus obtusa, integerrima, revoluta; supra saturate viridia, nitida, laevia; subtus pallidiora, nervo margineque

VOL. II.

K