

Sibthorp, John ; Smith, James Edward [Editor]: Flora Graeca, sive plantarum rariorum historia, quas in provinciis aut insulis Graecis legit, investigavit et depingi curavit John Sibthorp: hic illic etiam insertae sunt pauculae species quas vir idem clarissimus, Graeciam versus navigans, in itinere, praesertim apud Italiam et Siciliam, invenit (Voluminis quinti- Fasciculus primus): Vol. V.

London, 1825

Seite 82

20

DECANDRIA TRIGYNIA.

TABULA 428.

SILENE FRUTICOSA.

SILENE paniculâ corymbosâ coarctatâ subtrichotomâ, petalis emarginatis; appendiculo quadripartito, foliis obovatis, caule fruticoso.

S. fruticosa. *Linn. Sp. Pl.* 597. *Willden. Sp. Pl.* v. 2. 696. *Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 3.* 89. *Prodr.* v. 2. 299.

*Lychnis frutescens myrtifolia*, behen albo similis. *Bauh. Pin.* 205. *Tourn. Inst.* 335.

*L. sylvestris sempervirens*, sive *ocymoides*. *Clus. Hist.* v. 1. 293, *absque icone*.

*Saponaria frutescens*, acutis foliis, ex Sicilia. *Bocc. Sic.* 58. t. 30. f. 2.

*S. altera fruticosior*, ex Sicilia. *Casalp. de Plantis*, 256.

*Ocymoides fruticosum*. *Camer. Hort.* 109. t. 33.

*Behen albo officinarum similis planta*, sempervirens. *Bauh. Hist.* v. 3. p. 2. 357, *sine icone*.

In rupibus insulæ Cypri. ½.

*Caulis* fruticosus, teres, ramosus, spithameus; ramis fastigiatis, densè foliosis; floriferis elongatis, erectis, foliolosis, geniculatis, teretibus, pubescentibus, paniculatis. *Folia* obovata, mucronulata, integerrima, uninervia, recurvata, crassiuscula, saturatè viridia, sempervirentia, glabra, margine pubescentia; basi attenuata et elongata, in *petiolum* marginatum, ciliatum, amplexicaule. *Panicula* erecta, trichotoma, fastigiata, pubescens, bracteolata, multiflora. *Bractea* oppositæ, lanceolatae, acutæ, apice recurvæ. *Flores* magni, erecti, pedicellati. *Calyx* clavatus, subsecariosus, costis decem, rubicundis, pubescentibus. *Petalorum unguis* cuneiformes, virescentes; *lamina* cuneato-oblongæ; suprâ incarnatae, vel roseæ; subtùs venoso-virides; apice bifidæ, rotundatae; *appendiculæ* albidæ, quadripartitæ, laciniis intermediis majoribus, erosis. *Stamina* exserta, patentia. *Germen* ovatum, receptaculi proprii longitudine. *Styli* staminibus breviores. *Capsula* ovata, rigida, glabra, longitudine pedicelli, ore sexdentata. *Semina* præcedentis.

a. Calyx.

c. Stamina cum pistillo, et receptaculo proprio.

b, b. Petala.

d. Pistillum separatim.

TABULA 429.

SILENE ITALICA.

SILENE paniculâ corymbosâ divaricatâ subtrichotomâ, petalis semibifidis angustatis nudis, foliis spatulatis scabris.

S. italica. *Ait. Hort. Kew. ed. 2. v. 3.* 84.

*Cucubalus italicus*. *Linn. Sp. Pl.* 593. *Willden. Sp. Pl.* v. 2. 686. *Jacq. Obs. fasc.* 4. 12. t. 97.

*Lychnis viscosa angustifolia*, ex albo rubente flore, imis foliis ocymi. *Cupan. Pamph. ed. 1. t.* 14.