

MONADELPHIA DECANDRIA.

55

tereti, pubescente, circumscriptione septanguli; septempartita, lobis pinnatifidis, laciniis linearibus obtusis, integerrimis v. dentatis; *caulina* similia, sed brevius petiolata, et 5-partita, lobis minus pinnatifidis. *Stipulae* ovatae, acutae. *Cyma* terminalis, corymbosa, basi diphylla, glanduloso-pilosa, ter trichotoma, ramulis sensim abbreviatis, ultimis tres lineas longis, villosis; *foliis* ad basin cujusvis trichotomiae, tri-pluripartitis. *Calyx* villosissimus; *sepalis* coloratis, ovatis, acutis, mucronulatis, margine membranaceis. *Petala* pallide purpurea, cuneata, emarginata, imbricata, basi venulosa, calyce duplò majora. *Stamina* 10, alterna breviora; *filamentis* carneis, pilosis, subulatis, subrecurvis, basi omninò liberis; *antheris* oblongis, luteis. *Ovarium* villosissimum. *Stylus* purpureus, staminibus longior. *Stigmata* 5, recurva, linearia, purpurea. *Fructus* in herbario deest.

*Caulis* in exemplaribus omnibus Sibthorpianis est medio diphyllus, in unico etiam floridus; sed in Neapolitanis, Smyrnaeis et hortensibus meis constantè nudus.

a. Calyx apertus.

b. Petalum.

c. Adelpia, cum pistillo, aucta.

TABULA 660.

GERANIUM STRIATUM.

GERANIUM caule tereti erecto, foliis trilobis pubescentibus: laciniis ovatis acutis incisoserratis: lateralibus saepius bilobis, stipulis subulatis acuminatissimis, petalis cuneatis emarginatis, staminibus subaequalibus erectis basi subliberis.

G. striatum. *Linn. Sp. Pl.* 953. *Cavan. Diss.* v. 1. 207. t. 79. f. 1. *Willden. Sp. Pl.* v. 3. 702. *Curt. Bot. Mag.* t. 55. *DeCand. Prodr.* v. 1. 641.

G. romanum versicolor, sive striatum. *Tourn. Inst.* 267.

In Parnasso et Delphi montibus. 21.

*Radix* perennis, ramosus, subperpendicularis, flexuosus, castaneus. *Caulis* erectus, sesquipedalis v. ultra, subteres, pilis longis horizontalibus vestitus. *Folia radicalia* longissimè petiolata, pubescentia, triloba, laciniis latè ovatis acutis grossè serratis, incis: lateralibus bilobis; serraturis apiculatis; *caulina* brevius pedunculata et minus incisa. *Stipulae* subulatae, acuminatissimae, pilosae. *Pedunculi* axillares, suberecti, biflori, foliis longiores, levitè pilosi; *pedicelli* erecti, pedunculo duplò breviores. *Bractea* subulatae, elongatae. *Sepala* ovata, glabra, costis tribus pilosis, in mucrone acuminata. *Petala* alba, venis rubris striata, cuneata, emarginata, sepalis duplò majora. *Stamina* 10, aequalia, erecta, basi levitè monadelphia, *filamentis* omnibus fertilibus e lata basi subulatis; *anthera* oblongae, connectivo viridi, valvis purpureis. *Stylus* staminibus longior. *Stigmata* 5, linearia, recurvo-patentia. *Cocci* oblongi, pilosi, demùm in rostella extùs pubescentia intùs glabra revoluti. *Semina* oblonga, testà puncticulatà atro-brunneà.

VOL. VII.

q