

Sibthorp, John ; Smith, James Edward [Editor]: Flora Graeca, sive plantarum rariorum historia, quas in provinciis aut insulis Graecis legit, investigavit et depingi curavit John Sibthorp: hic illic etiam insertae sunt pauculae species quas vir idem clarissimus, Graeciam versus navigans, in itinere, praesertim apud Italiam et Siciliam, invenit (Voluminis septimi - Fasciculus secundus): Vol. VII.

London, 1830

Seite 82

72

DIADELPHIA DECANDRIA.

intermedio petiolato. *Stipulae* serratae, foliis delapsis persistentes. *Flores* axillares, subsessiles, solitariae. *Calyx* glanduloso-villosus, 5-fidus; *laciniis* subulatis corollâ longioribus. *Corolla* lutea; *vexillum* ovato-subrotundum, basi striatum; *alae* carinâ falcata paulò breviores. *Stamina* monadelphia. *Stylus* filiformis, glaber, staminibus longior; *stigma* obscure emarginatum. *Legumen* lineari-oblongum, pallidè testaceum, pilosum, calyce pallido persistente inclusum, 2-spermum. *Semina* brunnea, tuberculata.

a. Calyx à fronte visus.	b. Vexillum.	c. Ala.
d. Carina.	e. Adelpia staminum.	f. Legumen.
g. Ejusdem valvula altera, intùs visa.	h. Semen.	h. Idem, auctum.

\*\* *Floribus pedunculatis, pedunculo mutico.*

TABULA 677.

ONONIS CHERLERI.

ONONIS, caulibus diffusis hirsutis, foliis summis simplicibus: foliolis cuneatis apice denticulatis lateralibus minoribus, stipulis serratis, pedunculis unifloris muticis racemosis, calyce corollae aequali legumine pendulo 3-spermo brevior.

O. Cherleri. *Prodr.* v. 2. 57. nec *Linnaei*. *Willden. Sp. Pl.* v. 3. 1004. *DeCand. Prodr.* v. 2. 162.

Anonis pusilla, villosa et viscosa, purpurascens flore. *Tourn. Inst.* 408.

In insulâ Cypro. ☉.

*Radix* subsimplex, perpendicularis. *Caules* diffusi, 3—4 uncias longi, viscido-hirsuti, apice subpurpurascens. *Folia inferiora* trifoliata, *superiora* saepiùs simplicia, viscido-pilosa; *foliolis* cuneatis v. oblongo-cuneatis, apice denticulatis, lateralibus saepè angustissimis. *Stipulae* ovatae, subserratae. *Pedunculi* mutici, axillares, solitarii, foliis subaequales. *Calyx* villosus, 5-partitus; *laciniis* subulatis, corollae aequalibus. *Vexillum* subrotundum, purpurascens; *alae carinaeque* albæ. *Legumina* pendula, pilosa, oblonga, apiculata, testacea, 3-sperma, calyce paulò longiora. *Semina* fusca, tuberculata.

Species latitudine et hirsutiae foliorum variabilis, floribus parvis purpurascens racemosis semper distinguenda.

Ab *O. reclinatâ* *Linnaei* vix diversa, monente *Benthamico* nostro, nisi foliis angustioribus.

Hujus loci etiam, ut videtur, est *O. mollis*. *O. Cherleri* *Linn.* est *O. Columnæ* *Allionii*.

a. Flos, à fronte.	b. Calyx, cum adelpiâ.	c. Vexillum.	d. Ala.
e. Carina.	f. Legumen, calyce vestitum.	g. Idem, calyce adempto.	
h. Valvula altera Leguminis, intùs visa.		i. Semen.	I. Idem, auctum.