

Sibthorp, John ; Smith, James Edward [Editor]: Flora Graeca, sive plantarum rariorum historia, quas in provinciis aut insulis Graecis legit, investigavit et depingi curavit John Sibthorp: hic illic etiam insertae sunt pauculae species quas vir idem clarissimus, Graeciam versus navigans, in itinere, praesertim apud Italiam et Siciliam, invenit (Voluminis octavi - Fasciculus primus): Vol. VIII.

London, 1833

Seite 124

32

DIADELPHIA DECANDRIA.

TABULA 742.

TRIFOLIUM MAURITANICUM.

TRIFOLIUM caule erecto, foliis lineari-oblongis denticulatis subtus pubescentibus, stipulis dentatis aristatis, leguminibus obtusis arcuatim venosis.

T. mauritanicum. Willden. Sp. Pl. v. 3. 1354.

Melilotus sulcata. Desfont. Fl. Atlant. v. 2. 193. DeCand. Prodr. v. 2. 189.

M. longifolia. Tenore, Prodr. Suppl. v. 1. 66.

In Sicilia legit Sibthorp. Circa Messinam ubique copiose invenitur; at prior species nunquam. D. Arrosti. ☉.

Radix ramosa, non tuberculata. Caulis erectus, ramosus, 2-pedalis, altè sulcatus, pubescens. Foliola lineari-oblonga, obtusa, denticulata, subtus magis minusve pubescentia, basi integerrima. Stipulae angustae, acuminatissimae; dentibus baseos aristatis. Racemi stricti, foliis pluriès longiores. Flores parvi, lutei, quam praecedentis longè minores. Calyx dentibus brevibus, acutis, unguibus petalorum brevioribus. Vexillum acutum, vix ascendens; alae obtusae; carina acuta, apice incurva. Legumina pendula, curva, obtusissima; venis elevatis valdè arcuatis. Semen solitarium, compressum, pallidè brunnèum.

a. Flos integer.

B. Legumen, auctum.

A. Idem, auctus.

c. Semen.

b. Legumen.

C. Idem, auctum.

TABULA 743.

TRIFOLIUM SPICATUM.

TRIFOLIUM leguminibus monospermis spicatis erectis nudis rugosis acutis, stipulis subulatis integerrimis, caule erecto. Prodr. v. 2. 93.

In insulà Cypro. ☉.

Radix perpendicularis, ramosa, non tuberculata. Caulis erectus, ramosus, apice tantum pubescens, subpedalis. Foliola cuneato-oblonga, versus apicem grossè dentata, basi integerrima. Stipulae aristatae, integerrimae. Racemi stricti, foliis duplò longiores. Flores magnitudine T. mauritanici, lutei. Calyx brevidentatus, unguibus petalorum aequalis. Vexillum angustè cuneatum, acutiusculum, complicatum, in alas pronum; alae et carina lineares, obtusae. Legumina erecta, subsphaerica v. subrotundo-