

T A B U L A 6 5 3.

FICUS TINCTORIA.

P O L Y G A M I A D I O E C I A.

CHAR: ESSENT: *Receptaculum commune turbinatum, carnosum, connivens, occultans. Flosculos vel in eodem vel distincto. MASCULI: Calyx 5-partitus. Cor. o. Stam. 3. — FEMINEI: Cal. 5-partitus. Cor. o. Pistillum 1. Sem. 1. Calyce persistenti clauso, subcarnoso tectum.*
FICUS tinctoria: foliis oblique ovatis, obtusis, receptaculis, turbinatis, basi calyculatis. *FONSTER Prod. Nro. 405. WILLD. Spec. Plantar. Vol. IV. p. 1142. Nro. 36. DE TUSSAC, Flore des Antilles, Tom. II. Livr. 4. p. 55. t. 14.*

Habitat in Societatis Insulis. 5.

INVOLUCRUM carnosum, turbinatum aut sphaericum, basi caliculo triphylo munitum, apice multiplici serie denticulorum subclauso, flores masculos et femineos pedicellatos, aut simul includens, aut alios femineos tantum aut masculos. Flores masculi, numero pauciores, apicem internum receptaculi obtegunt, feminei, reliquam partem.

MASCULORUM: *Calyx tripartitus. Stamina tres. Corolla nulla. Rudimentum pistilli.*

FEMINORUM: *Calyx quinque-partitus. Corolla nulla. Ovarium superum, ovatum. Stylus lateralis, incurvus; Stigmata duo inaequalia.*

FRUCTUS semen compressum, pulpa succulenta involutum. *DE TUSSAC l. c.*

Ramus fructifer, naturali magnitudine.