

T A B U L A 799.

BLAKEA TRINERVIA.

D O D E C A N D R I A M O N O G Y N I A.

CHAR: ESSENT: *Calyx* campanulatus, limbo 6-dentato squamis cinctus.
Petala 6, callo calycis inserta. *Antherae* basi appendiculatae, sub-coalitae. *Stigma* simplex. *Capsula* baccata 6-locularis, placentis crassis axi centrali affixis, polyspermis. *Melastomaceae*.

BLAKEA *trinervia*: foliis ovali-oblongis, utrinque nitidis, parallele venosissimis, ramis rufo-tomentosis, pedunculis solitariis, squamis calycem excedentibus imbricatis. *Linn. Syst. veget. cur. SPRENGEL, Vol. II. p. 457.*

BLAKEA *arborescens*: foliis decussatis, ellipticis, tri-nerviis; floribus hexapetalis, roseis, lateralibus pedunculis oppositis, unifloris. *de Tussac, Flore des Antilles, Tom. III. p. 85. t. 24. BROWN Jam. p. 323. t. 35.*

Habitat in Jamaica. b.

CALYX duplex, exterior inferius, hexaphyllus; foliolis duabus exterioribus oppositis majoribus, concavis, obtusis; quatuor interioribus brevioribus coniciatis oppositis, inaequalibus, interior monophyllus, superus cupuliformis, coloratus, margine sex-lobatus, lobis brevibus rotundatis.

COROLLA hexapetala, petalis aequalibus ovatis, erectis, basi angustioribus, mox deciduis.

STAMINA 12, filamentis erectis, aequalibus, antheris in annulum concatenatis.

PISTILLUM: *Ovarium* inferum, turbinatum, striatum, margine calycis cinctum. *Style* subulato staminibus longiori; *Stigmate* simplici.

PERICARPIUM: *Capsula* subtropando-ovata, sex-locularis, loculis polyspermis, seminibus numerosissimis. *de Tussac l. c.*

Ramus florens naturali magnitudine.

1. Calyx. — 2. Petalum. — 3. Corolla interior. — 4. Corolla cum staminibus et Pistillis in situ. — 5. Ovarium. — 6. Idem dissecutum.

