

TABULA 800.

CALCEOLARIA PARALENSIS.

DIANDRIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: *Calyx* quadri-partitus. *Corolla* bi-labiata, labium inferius inflato calceiformi. *Antherae* loculis divaricatis, altero sub-sterili. *Capsula* semi-bivalvis, valvis bifidis.

CALCEOLARIA *paralensis*: foliis oblongis, serratis, glaucescentibus, tomentosis, corymbis terminalibus compositis, capsulis tomentosis. *LINN. Syst. vegetabil. cur. SPRENGEL, Vol. I. p. 45.*

CALCEOLARIA *paralia*: *CAYAN. Icon. Vol. V. p. 29. t. 447. VAHL Enumer. Vol. I. Nr. 10. ROEMER et SCHULTHEIS Syst. vegetab. Vol. I. Nr. 10. p. 180.*

Habitat in Chili. ♂.

CAULIS pedalis aut sesqui-pedalis, parce foliolis, erectus, gracilis, rufo-tomentosus, superne dichotomus, glanduloso-tomentosus.

FOLIA radicali-majora tres vel quatuor pollices longa, oblongo-ovata, obtuse inaequaliter dentato-crenata, subtus elevato-venosa, basi sub-cuneata, integra, in petiolum circiter unciam longum decurrentia, unicum foliorum par, raro duo opposita, lanceolata, fere unciam longa, infra paene caulis dichotomam posita, dum superiora ut plurimum oblonga, et in processu caulis divisurae plus vel minus cordata, utraque sessilia. Omnia plus vel minus pubescentia, praesertim juniora inprimis subtus ut plurimum tomentosa.

FLORES plurimi magni et speciosi in panicula dichotoma sub-corymbosa terminali glandulosa-pilosa aggregati; ad dichotomiae cujuscunque basin bractae, duo foliaceae, sessiles oppositae, cordatae aut lanceolatae pubescentes, quorum superae reliquis angustiores.

CALYX obscure viridis, laciniis quatuor patulis reflexis, more pedicellorum ad margines revolutas glandulosas pubescentibus.

COROLLA obscure lutea bi-labiata. *Labium*: superius fornicatum acutum; inferius versus faucem angustatum; striis aliquot aurantiis.

STAMINA duo. *Filamenta* brevia, erecta, alba, subulata. *Antherae* pallide luteae, cellulis divaricatis. *Pollen* albus. *Pistillum* exiguum. *Germen* orbiculo-ovatum, viride glandulosum, bi-loculare. *Stylus* brevis erectus, ut plurimum subulato-cylindricus, glaber. *Stigma* sub-acutum.

Ramus florens naturali magnitudine.

1. Flos. — 2. Ejusdem sectio verticalis. — 3. Anthera et Pistillum. —
4. Calyx cum Pistillo. — 5. Germen dissectum. — 6. Pollen.